

ReZist®



CARACTERÍSTICAS

- Es un producto que estimula el metabolismo de la planta, ayudándola a tolerar de mejor manera el estrés (biótico y abiótico).
- Contiene en su formulación Cobre, Zinc y Manganeseo.

La formulación de ReZist® permite mantener el metabolismo de las plantas en equilibrio.

Los microelementos presentes en el producto promueven la actividad enzimática y el funcionamiento de la planta.

ReZist® estimula y reactiva el metabolismo de las plantas, promoviendo la resistencia a distintos tipos de estrés bióticos y abióticos.

● Composición Química

Cobre (Cu)	1,75%
Zinc (Zn)	1,75%
Manganeseo (Mn)	1,75%

% expresado en Peso/volumen
Contiene compuestos fenólicos.

● Características Físico-Químicas

Estado físico	Líquido
pH	9,5
Densidad (g/L)	1200 g/L a 20°C
Solubilidad en agua	100%

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Cereales	1 - 1,5 L/ha	3 - 4 aplicaciones
Hortalizas en general y papas	250 - 300 cc / 100 L agua	Aplicación 10 días antes de transplante a 0,5%. Aplicación 25 días después de transplante al 0,0%. Repetir a los 30 días al 0,5%.
Manzano, peral, naranjo, pomelo, limonero, mandarino, palto, almendro, nectarino, cerezo, ciruelo, nogal, duraznero, damasco, olivo, arándano, frambueso, frutilla, uva de mesa y viñas.	1 - 1,5 L/ha	Inicio de brotación. Repetir a los 20 días si es necesario post cosecha.
Kiwi	1 L/ha	Aplicar desde inicio de brotación y cada 7 días hasta completar 4 aplicaciones., buscando promover la tolerancia natural de las plantas a estrés de tipo abiótico (radiación, sequía, etc.) y biótico (promoviendo una mejor tolerancia natural a algunos agentes biológicos, etc.). Apoyar con una aplicación de 1 l/ha pre cosecha si fuese necesario.


*Las aplicaciones no deben superar el 1% de concentración de ReZist®.

ReZist®



MUERTE DE LA PLANTA
Proteínas Protectoras
Etileno

Resistencia
Sistémica Adquirida
POLIAMINAS



Ciclo que controla la producción de etileno y poliaminas.

ReZist® DISMINUYE EL ETILENO y POR LO TANTO EL ESTRÉS

Además, promueve una mayor tolerancia de las plantas, estimulando la activación de moléculas protectoras, aumenta la resistencia natural de las plantas contra el estrés con acción preventiva sobre plateado en ciruelos y kiwis, enrrollamiento clorótico en uva de mesa, cáncer bacterial en cerezos, phytophthora en paltos y problemas ocasionados por hongos en hortalizas.

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2- **ReZist®**
- 3- Agroquímico

Stoller en su región es:



Para consultas técnicas contactarse con el Ing.
Agrónomo de Stoller en su zona o con el
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A.

stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.A
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.

XV Región
Alvaro Villarroel
+56 9. 3 224 0339

III Y IV Región
Ulises Pizarro | Felipe Pizarro
+56 9. 9 534 2016 | +56 9. 3 443 3941

V Región
Luisa Baeza
+56 9. 6 845 3268

Región Metropolitana
Oriana Reyes | Josefa Bitsch
+56 9. 4 248 8538 | +56 9. 3 379 4332

VI Región
Alejandro Guajardo | Nicolás Torres
+56 9. 8 916 2012 | +56 9. 9 451 4354

VII Región
Paula Vargas | Nicole Guzmán
+56 9. 9 451 4384 | +56 9. 3 469 1858

VIII Región
Luis Milla
+56 9. 9 630 6790

IX Región
Camilo Quezada
+56 9. 4 010 6875

XIV y X Región
Antonio Villagra
+56 9. 9 537 5239

Jefe Regional Zona Norte
(III a VI)
Fredy Morales
+56 9. 9 451 4385

Jefe Regional Zona Sur
(VII a XIV)
Claudio Romero
+56 9. 9 161 8424