



YaraVita™

Frutrel™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Frutrel™

Fertilizante foliar NP con calcio, magnesio, zinc y boro con extractos de algas marinas

Contiene:

6,9% p/v (69 g/l) Nitrógeno (N),
24% p/v (240 g/l) Fosfato (P_2O_5),
20% p/v (200 g/l) Calcio (Ca),
5,9% p/v (59 g/l) Magnesio (Mg),
2% p/v (20 g/l) Boro (B),
4% p/v (40 g/l) Zinc (Zn)

Floable

Solubilidad en agua - 47% a 20°C

pH - 9.5

Densidad 1590 g/L a 20°C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 50; Cd ≤ 20; As ≤ 20; Hg ≤ 2

Número de Lote: CLXXXXXXX

Fecha de Fabricación: 05/2019

Fecha de Vencimiento: 05/2021

Fabricado por Yara UK Ltd - Inglaterra

Importado y Distribuido Yara Chile Fertilizantes Ltda.

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 309 - Providencia - Santiago.

Fono(56-2) : 232 57 12

Atención

Contiene ácido bórico, sal de cinc

H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.

H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en según los reglamentos locales.



10 litros

YaraVita Frutrel™

RECOMENDACIONES DE USO

Arándanos: Aplicar 4 a 5 l/ha al inicio del crecimiento de los brotes, pudiendo repetir dos veces a intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Cerezo, Ciruelo, Duraznos, Nectarinos: Dos aplicaciones de 5-7,5 l/ha entre brotación de las yemas y el inicio de floración. Además entre 2 a 5 aplicaciones a 5-7,5 l/ha desde cuaja en intervalos de 10-14 días. Evitar aplicar dentro del último mes antes de la cosecha. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Damascos: Dos aplicaciones de 4 a 5 l/ha entre brotación de las yemas y el inicio de floración. Además entre 2 a 5 aplicaciones de 4 a 5 l/ha desde cuaja en intervalos de 10-14 días. Evitar aplicar dentro del último mes antes de la cosecha. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Klwi: Aplicar en dosis de 4 a 5 l/ha cuando las primeras hojas estén completamente desarrolladas, en caída de pétalos y repetir 2 veces más a intervalos de 10 a 14 días. Nota: aplicar hasta frutos de 25 mm. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Manzano, Perales: aplicar 4 a 5 l/ha en brotación.

También aplicar 2 a 5 veces en dosis de 4-5 l/ha, a intervalos de 10 a 14 días, a partir de frutos de 20 mm en adelante. No aplicar durante los 30 días que anteceden al inicio de la cosecha. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Nueces (de hoja caída): Nogales, Castaños y Avellanos: Realizar 3 aplicaciones en dosis de 3 a 5 lt/ha en prefloración, repitiendo al final de floración y 15 días después. Volumen de agua 500 l/ha.

Uva de mesa, Uva vinífera: Realizar 3 aplicaciones a 2,5 hasta 5 l/ha a partir de inicio de floración en intervalos de 10 a 14 días. No aplicar con frutos de mas de 5 mm. Volumen de agua: 200 l/ha. obs: Aplicaciones tardías pueden dejar residuos en el cultivo. No aplicar con fruto mayor a 5 mm de diámetro.

Por favor tener en cuenta que este producto puede dejar un residuo blanco. No aplicar en el plazo de un mes antes de la cosecha.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascar protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.