

Precauciones de uso

Se recomienda utilizar medidas de protección adecuadas, mantener fuera del alcance de los niños, inutilizar los envases, eliminar según instrucciones autoridades competentes, no fumar, beber mientras se manipula, guardar en lugar fresco y seco, alejado de luz y calor.

Nota del fabricante

El fabricante garantiza que este producto ha sido formulado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y que las recomendaciones de uso indicadas son meramente referenciales. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación y empleo.

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N)	5,6% (p/p)
Cobre (Cu)	1,46%(p/p)
Manganeso (Mn)	0,71%(p/p)
Zinc (Zn)	0,52% (p/p)

Agente Complejante: Ácido lignosulfónico

Ausencia de *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*.

OTROSPARÁMETROS FISCOQUÍMICOS:

Solubilidad en agua (a 20°C):99,98%

pH:3,92

Densidad (a 20°C):1,240g/L

METALES PESADOS:

Arsénico 0,06 mg/kg

Mercurio<0,010 mg/kg

Cadmio 0,22 mg/kg

Plomo 5,27 mg/kg

Instrucciones de triple lavado

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sinlimpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizarel envase para evitar que sea reutilizado.

AGITAR ANTES DE USAR

VENCIMIENTO: XX/XXXX

CONTENIDO NETO: 1 L

MASA NETA: 1.265 kg

LOTE: XXXXXXXX


Fabricado y comercializado por Grupo Agrotecnología, S.L.

Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57

03300, Orihuela, Alicante, Spain

Tlf. 0034 966 738 232; www.agrotecnologia.net

Brotone



CARACTERÍSTICAS

Brotone es un producto a base de mezcla de extractos vegetales y nutrientes seleccionados (Cu, Mn y Zn) que estimulan el crecimiento de la planta. Posee gran estabilidad, rápida absorción por hojas, tallos y raíces.

RECOMENDACIONES DE USO APLICACIÓN FOLIAR

Cultivo	Dosis (cc/100 L)	Observaciones
Vid (frutales en general, berries y frutilla)	300-500	Aplicar desde incios de brotones hasta post-cosecha, especialmente en casos de fiebre de primavera, intoxicaciones por herbicida u otro tipo de estrés.
Cítricos y palto	300-500	Aplicar al inicio de los flushes
Hortalizas	300-500	Aplicar desde trasplante a cosecha. En haba, arveja y poroto aplicar desde planta de 10 cm hasta pre flor.
Papa	300-500	Aplicar desde emergencia hasta pre-cosecha
Para huertos en formación se recomienda aplicar desde brotación, cada 15 días.		

RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIÓN VIA RIEGO:5L/ha

Aplicar al inicio de los flushes radicales.

OBSERVACIONES

No mezclar con aceites, aminoácidos, azufres, cobres, captan o ziram. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

En ciruelos **NO** aplicar vía foliar.

BROTONE es un producto de baja toxicidad, por ser un producto natural, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

Distribuidopor:

MIP-AgroLtda.

Teléfono:(72)2585210

www.mipagro.cl

REQUINOA