



Decis[®]

2.5 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Deltametrina, 25 g/L

Aditivos, csp 1 L

Reg.N° 219-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Bayer S.A.
Av Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima - Perú
Telf. 211 3800

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



Lote N°
Fecha de
Formulación:
Fecha de
Vencimiento:



Contenido Neto: 5L

®=Marca Registrada del grupo Bayer

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Utilizar máscaras y guantes protectores durante la aplicación del producto. No ingerir alimentos ni fumar.

Luego de efectuada la aplicación, lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto. Cambiarse de ropa.

Enjuagar el equipo utilizando abundante agua.

Evitar la inhalación y el contacto directo con la piel.

No verter los residuos de la aplicación en acequias, desagües, lagos o ríos.

No almacenar, ni transportar el producto con alimentos, bebidas, ni medicinas.

Mantener el producto en sus envases originales herméticamente cerrados y guardarlo en lugar fresco.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Piretroide

Acuda de inmediato al médico, hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, lavar las partes expuestas al contacto, abrigarlo bien.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

En caso de ingestión del producto, tratar sintomáticamente. En caso necesario acudir al médico. Mientras tanto, provóquese el vómito dando de beber al paciente agua tibia con sal. Mantenerlo en reposo. De producirse irritaciones en la piel lavar con un jabón alcalino.

ANTIDOTO:

No se ha determinado antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

Tóxico a peces, aplique lejos de fuentes de agua.

Tóxico a abejas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DECIS 2.5 EC es la síntesis del isómero más activo de deltametrina, grupo piretroide. Actúa por contacto e ingestión y tiene efectos lipofílicos por esto su efecto inicial es inmediato y su residualidad bastante larga.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	%	l/ha		
ALGODON	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.15	0.8	30	0.02
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.1	0.5		
TOMATE	Gusano del fruto	<i>Prodenia eridania</i>	0.1	0.5	7	0.3
	Gusano verde medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.1	0.5		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.15	0.8	1	0.01
	Pulgulla saltona	<i>Epitrix sp.</i>	0.1	0.5		
ALFALFA	Caballada	<i>Anticarsia gemmatilis</i>	0.1	0.5	28	0.02
	Cogollero	<i>Epinotia aporema</i>	0.1	0.5		
REPOLLO, COL, COLIFLOR	Gusano verde medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.1	0.5	7	0.1
	Gusano perforador de hojas	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	0.5		
TABACO	Gusano verde medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.1	0.5	7	N.d.
	Cachudo	<i>Manduca sexta</i>	0.1	0.5		
	Pulgulla saltona	<i>Epitrix sp.</i>	0.1	0.5		
FRÍJOL, SOYA, VAINITA Y PALLAR	Perforador de brotes	<i>Epinotia aporema</i>	0.1	0.5	7	0.2
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.15	0.8		
	Gusano verde medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.1	0.8		
	Pegador de hojas	<i>Omiodes indicata</i>	0.1	0.5		
	Perforador de brotes y vainas	<i>Laspeyresia leguminis</i>	0.1	0.5		
CEBOLLA, AJO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.5	7	0.05
ESPARRAGO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.5	3	0.05
VID	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.05-0.075	--	3	0.2

NOTA: Emplear la dosis en porcentaje (%) ó ml/cil cuando se use pulverizadora manual; para aplicaciones en avión, tractor o mochila a motor emplear la dosis en l/ha previa calibración del gasto de agua por ha.

*PC = Período de Carencia (días) **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según nivel de daño económico de las plagas en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: DECIS 2.5 EC es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común excepto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

