

Clipper®

500 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole	250 g/L
Propiconazole	250 g/L
Aditivos	c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 1208 - SENASA

Grupo Químico: Triazoles

Nombre Químico:

DIFENOCONAZOLE: 3-cloro-4-(4-metil-2-(1H-1,2,4-

Triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il) fenil-4-clorofenil éter

ROPICONAZOLE: (2RS, 4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole


Formula Empírica:

Difenoconazole: $C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$

Propiconazole: $C_{17}H_{17}Cl_2N_3O_2$

Peso Molecular: 406 g/mol y 342 g/mol, respectivamente.

Formula Estructural:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Amarillo café

Olor: característico

pH: 6 - 10

Densidad: 1.07 - 1.11 g/ml a 40°C

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad: Estable por 2 años manteniéndolo en su empaque original a temperatura ambiente.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

250ml, 500ml, 1L, 200 L

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Wan Shi Town, Yixing,

Jiangsu, 214217 China

Teléfono: (86-510)8785 1001



Point

ENTREGAMOS CALIDAD

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

• Grupo químico: Triazoles. • En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y muéstrela la etiqueta o la hoja informativa adjunta. • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. • En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración. • Nota al Médico: No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia: SAMU.106,

CICOTOX:(01) 328- 7700. POINT ANDINA S.A.:348 1018

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

• Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

• El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación. • Causa irritación moderada a los ojos. • El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas. • Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. • Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes. • Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado. • No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CLIPPER 500 EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Es absorbido rápidamente por las plantas, actuando sobre los hongos que atacan el cultivo. Su acción principal es interfiriendo con labiosíntesis de esteroides en la membrana celular. Los mejores resultados del producto se obtienen cuando se aplica en los primeros estados de desarrollo del hongo.

CLIPPER 500 EC se aplica mezclando la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada, buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña. En el cultivo de arroz, la primera aplicación debe hacerse en el macollamiento medio y la segunda en pleno embuchamiento del arroz. En el cultivo de cebolla las aplicaciones se realizan durante el crecimiento vegetativo con una frecuencia de 10 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de aplicado el producto.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad **COMPATIBILIDAD:**

CLIPPER 500 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. Evitar los ácidos, álcalis y agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente hoja informativa.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS ml/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Helminthosporium	<i>Helminthosporium oryzae</i>	250 - 300	42	0.05* 0.7**
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	250	14	0.1* 0.2**
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500	30	0.03* 0.05**
Granada	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	300	33	0.1* 0.01**
Maíz	Mancha negra del maíz	<i>Phyllachora maydis</i>	200 - 400	30	0.05* 0.05**

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

* Difenconazole/ ** Propiconazole

