

28.5 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

EN VIVO SC, no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo, siendo una sustancia de origen orgánico, se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda mover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

Antídoto: No posee antídoto.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 328 7700,
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

EnVivo[®] SC

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA


SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Virus de la poliedrosis nuclear (NPV).....2 billones PIB/ml

Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado Y

Distribuido por:

POINT ANDINA S.A

Calle Loreto 304
Urb. Sta Patricia, II Etapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/349-9609

Formulado por:

POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217. China
Tel.(86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto : 1 L

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EN VIVO SC, es un insecticida biológico con acción principalmente de ingestión. Cuando las hojas tratadas con **EN VIVO SC** son ingeridas, la acción que es producida por el conjunto de virus que contiene el producto, causan la infección viral en el hospedero específico y finalmente produce la muerte de las larvas.

Para mantener activos los cuerpos de inclusión durante períodos largos (meses, años), se recomienda mantener **EN VIVO SC** en lugares frescos hasta el momento de su aplicación.

Sistemas de preparación y aplicación

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua, ya que con pH alcalino se hidroliza el virus. El pH ideal es 6.5. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto que se va a utilizar, agitar y mezclar homogéneamente, agregar el coadyuvante si es que se va a utilizar y verter en el tanque del equipo que se va a utilizar, completar con agua hasta llenar el tanque. En caso de utilizar máquinas de aplicación mantener los agitadores en funcionamiento. Se puede aplicar con equipos manuales y motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Los mejores resultados se obtienen pulverizando en la tarde, evitando las horas de mayor radiación solar y alta temperatura, debido a que los rayos ultravioletas degradan los viriones.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO "

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Alcachofa	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.35 - 0.50	NA	NA
Arándano	"Gusano perforador del fruto"	<i>Heliothis virescens</i>	0.40	NA	NA
Brócoli	"Polilla del dorso de diamante"	<i>Plutella xylostella</i>	0.25	NA	NA
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	NA	NA
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	NA	NA
Palto	"Bicho del cesto"	<i>Oiketicus kirbyi</i>	1.50	NA	NA
Pimiento	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	NA	NA
Pimiento	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	NA	NA

PC: Período de Carenia

LMR: Límite máximo de residuos en ppm (partes por millón)

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe ser mezclado con pesticidas de reacción alcalina. Cuando se mezcla con pesticidas químicos neutros, debe ser usado inmediatamente.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN



PANTONES



376 C



362 C



341 C



7740 C



293 C



356 C



C:30 M:50 Y:75 K:10



C:66 M:8 Y:90 K:0



C:74 M:38 Y:88 K:35

LOGO POINT

TRIANGULO TRIPLE LAVADO

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO EN VIVO