

ADAMA

Rimon® Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Novaluron50 g/L

Bifenthrin50g/L

Aditivos c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 1600 - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60,
Be'er Sheva 8410001. Israel.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Contenido neto: **4 Litros**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas se debe utilizar para conservar alimentos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No desatarar las boquillas soplando con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzotifenil urea + Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos mantenga el párpado abierto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-13040; INFOSALUD: 0800-10-828; CISPROQUIM: 080-050847, ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rimon Duo es un insecticida de acción combinada (contacto + ingestión) que brinda control inmediato y prolongado de larvas fitófagas y adultos de insectos masticadores.

Rimon Duo se aplica en aspersión directa al follaje con equipo de pulverización terrestre. Esperar que el rocío se seque antes de aplicar y mantener en marcha el sistema de agitación durante la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/Ha)		
Arándano	Gusano perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	0.3	-	7	1.8¹/7²
Brócoli	Gusano de la col (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.3	-	7	0.4¹/0.7²
Frijol	Gusano medidor (<i>Chrysodeixis includens</i>)	0.2	-	14	0.3¹/0.1²
Maíz	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.3	-	100	0.05¹/0.05²
Palto	Gusano del cesto (<i>Oiketicus kirbyi</i>)	0.2	-	30	0.5¹/0.6²
Pimiento	Gusano perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	-	0.75 - 1.0	7	0.5¹/0.7²
	Polilla (<i>Symmetrischema capsicum</i>)	-	0.75 - 1.5		

PC.: Período de Carencia

LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón). 1-Bifenthrin / 2-Novaluron

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar hasta dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días. Considerar una (01) campaña al año en los cultivos de arándanos, paltos y pimientos, y dos (02) en brócoli, frijol y maíz.

Momento de aplicación
Ver la hoja informativa.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contracara