Tamaño: 27 x 15 cms 07.11.22

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

BC-1000® Líquido es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo, no irritante, inodoro, estable a la luz y a temperaturas de hasta 40°C.
Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Protéjase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general.
Si el contacto es por vía dermal: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas.
Si el contacto es por vía ocular: Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los parpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.
Si el contacto es por vía oral: No inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de Información Toxicológica.
Si el contacto es po inhalación: trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo, conseguir atención medica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación.

NOTA AL MEDICO:

No inducir vómito, administrar carbón activado (o medicina), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa.

ANTIDOTO:

No tiene antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 CHEMIE AGROVETERINARIA: 511- 7141788

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No vierta **BC-1000® Líquido** puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- **BC-1000® Líquido** es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BC-1000® Líquido

(ÁCIDO ASCÓRBICO, BIOFLAVONOIDES, CÍTRICOS, ÁCIDO CÍTRICO, PEPSINA CÍTRICA Y AZÚCARES)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – (EC)

Composición:

Cada 100 mL de **BC1000® Líquido** contiene:

Biomasa cítrica	50 % por peso
La cual contiene:	
Acido ascórbico (Vit C)	min 2,50 % por peso
Bioflavonoides cítricos (Vit. P)	0,50 - 2.00 % por peso
Acido cítrico, pepsina cítrica y azucares	0.80 - 1.20 % por peso
Residuos vegetales cítricos	44.30 - 46.20 % por peso
Vehículo inerte	50 % por peso

Reg. PBUA N° 060-SENASA.

Titular del Registro: CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.

CHEMIE® Innovación Agroveterinaria

Formulado por: CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C..,
Car. Panamericana Sur Km. 17.4, Mza. C lote 3
Urb. La Concordia, Villa El Salvador,
Lima - Perú, Fono (51 1) 3720456

Distribuidor: CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.
Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar
Teléfono: 511 - 7141788
Lima - Perú

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: ☐ 1 L ☐ 5 L ☐ 20 L ☐ 200 L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Fungicida natural de contacto con un excelente control preventivo y curativo sobre *Botrytis, Penicillum, Fusarium, Erwinia,* Oidio y algunos hongos y bacterias en post cosecha en vides, frutales, hortalizas y plantas ornamentales. Especialmente indicado para el control de *Botrytis*.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para usar adecuadamente **BC-1000® Líquido** se recomienda agregar agua al estanque de aplicación hasta aproximadamente la mitad de sus capacidad y luego incorporar la dosis recomendada de **BC-1000® Líquido** finalmente llenar el estanque. Es necesario realizar esta maniobra con agitación constante.

APLICACIÓN:

La aplicación se efectúa mediante aspersor, pulverizador o nebulizador, directamente sobre el área deseada. El producto esta especialmente indicado para ser utilizado en el control y eliminación de los microorganismo indicados a continuación:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C	**L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	mL/100 L de agua		
Vid	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	150 - 220	N.A	N.A.
Páprika	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	170 - 220	N.A	N.A.
Tomate	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	170 - 220	N.A	N.A.
Alcachofa	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	150 - 180	N.A	N.A.
Holantao	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	150 - 220	N.A	N.A.
Banano	Pudrición de la corona	Complejo fungoso *Lasiodiplodia theobromae Macrophoma sp Thielaviopsis paradoxa*	300 - 500	N.A	N.A.
	Sigatoka negra	*Mycosphaerella fijiensis*	200 - 400 ml/Ha		
Mango Pre-cosecha	Antracnosis	*Colletotrichum gloesporioides*	150 - 200 mL/100 L de agua. Aplicar 35 y 25 días antes de la cosecha.	N.A	N.A.
Post-cosecha			75 - 100 mL + 100 L de cera vegetal (Inmersión o aspersión)		
Arándano	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	1,5 - 2,0 L/Ha	N.A	N.A.
Palto (post cosecha)	Antracnosis	*Colletotrichum gloesporioides*	250 mL/100 L	N.A	N.A.

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Cientifico			
Vid	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	Aplicaciones preventivas: 1,5 - 1,8 L/ha Aplicaciones curativas: 2,0 – 2,3 L/ha	N.A	N.A.
	Pudrición ácida	*(Aspergillus spp., Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Rhizophus sp., Penicillium spp..)*	Aplicaciones preventivas: 1,8 a 2,3 L/ha Aplicaciones curativas: 2,3 a 2,5 L/ha	N.A	N.A.

P.C. = Periodo de Carencia **L.M.R. =Límite Máximo de Residuos N/A= No aplica
NOTA: Para el control de Sigatoka negra en bananos se recomienda aplicar con un volumen de agua de 350 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Nota: Para el control de Sigatoka negra en bananos se recomienda aplicar con un volumen de agua de 350 L/ha.
Para el control de *Botrytis* en parronales y viñas, hacer la aplicación sólo hasta floración pues puede causar mancha al fruto por aplicación defectuosa.
Por ser un producto orgánico natural, puede ser usado en precosecha y cosechas sin problemas de residuo en programas preventivos.
Para control de *Botrytis* realizar las aplicaciones cada vez que existan condiciones propicias a la enfermedad (aplicaciones preventivas).
Para control de Botritis en tratamiento de postcosecha debe aplicarse las dosis recomendadas **BC-1000® Líquido** de mediante asperjado o inmersión a través de tinas, estanques con ducha, etc.
Para el control de Sigatoka Negra se debe mezclar **BC-1000® Líquido** con aceite agrícola y se recomienda hacer aplicaciones con un intervalo de 10 días, utilizando la dosis mas alta en épocas de alta precipitación.
Para control de arándanos realizar aplicación preventiva cuando hayan condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad o se observe indicios de su presencia.
Para control de arándanos en post cosecha se recomienda usar la dosis mayor en condiciones predisponentes para el patógeno (zonas lluviosas, con alta humedad relativa (mayor de 90%) y temperatura de 15 a 20°C).
La cantidad de agua a utilizar en la aspersión de **BC-1000® Líquido**, no debe ser menor de 750 litros/ha.
Se recomienda realizar por lo menos tres aplicaciones, en los estados fenológicos de floración a fruticación. El periodo de tiempo entre las aplicaciones debe ser de 7 a 10 días, dependiendo principalmente de las condiciones de clima favorable para B. cinerea.
Para el control en paprika, tomate, alcachofa, holantao realizar de 2-3 aplicaciones por campaña.
Para el control de mango precosecha realizar dos aplicaciones a los 32 y 25 días antes de la cosecha y para post cosecha realizar la aplicación en inmersión.

PERÍODO DE REINGRESO: Reingresar al área aplicada después de las doce (12) horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación de campo.

FITOTOXICIDAD: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN