

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Terramicina* Agrícola - 5 WP

BACTERICIDA ANTIBIOTICO, BACTERIOSTATICO
OXITETRACICLINA

PRECAUCION
ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:

Los ingredientes activos del producto actúan de manera sistémica siendo absorbidos vía foliar y por lo tanto son translocados a las diferentes partes de las plantas vía floema matando las bacterias por contacto (bacteriostático).

EQUIPO DE APLICACION:

El producto una vez preparado se debe aplicar utilizando bomba de espalda. El equipo deberá calibrarse utilizando agua. El producto no tiene ningún efecto corrosivo sobre el equipo. Utilice boquilla tipo cono hueco. Para la aplicación se deben usar botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes y ropa protectora.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Pesar y disolver en agua la dosis recomendada en recipiente separado al tanque aspersor. Llenar el tanque aspersor hasta un tercio de su capacidad. Agregar la dosis de la Terramicina* Agrícola 5 WP, complete la capacidad del tanque con agua limpia y agite hasta obtener una mezcla homogénea. Se debe aplicar dirigido al follaje a todo el cultivo o a los focos de infección. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua.



RECOMENDACIONES DE USO:

La Terramicina* Agrícola 5 WP está recomendado en los siguientes cultivos:

Cultivos:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) Soya | Glycine max |
| (2) Ajonjolí | Sesamum indicum |
| (3) Frijol | Phaseolus vulgaris |

Para el control de las siguientes enfermedades:

Enfermedades:

- | | |
|---|----------------|
| (1) Amarillamiento | Mycoplasma sp. |
| (2) Amarillamiento y enchinamiento foliar | Mycoplasma sp. |
| (3) Amarillamiento | Mycoplasma sp. |

DOSIS:

Aplicar a razón de 400 gramos de producto formulado por cada 200 litros de agua y aplicar por primera vez cuando el cultivo presente un 10 % de floración y continuar aplicando a intervalos de 5 días durante la floración, pero no aplicar dentro de los treinta días de cosecha. Para aumentar la adherencia y penetración de la Terramicina* Agrícola 5 WP debe agregarse de 1 a 2 litros de glicerina por cada 200 litros de solución.

EPOCA DE APLICACION:

Iniciar aplicaciones con la aparición de los primeros síntomas.

INTERVALO DE APLICACION: Se recomienda aplicar a intervalos de 5 a 7 días durante el ciclo vegetativo del cultivo en caso de programas preventivos. Mínimo tres aplicaciones. En caso de aplicaciones curativas seguir las recomendaciones del profesional en ciencias agrícolas.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Siete días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Dos horas.

FITOTOXICIDAD:

En algunos casos se pueden presentar clorosis en los bordes de las hojas, que desaparecen de dos a tres días después sin daño aparente para la planta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas excepto de tipo biológico, fertilizantes foliares, coadyuvantes (adherentes, humectantes, dispersantes) y fungicidas excepto aquellos que en solución presenten reacción alcalina como (BHC). No se recomienda disolver con aguas duras.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No comer, beber o fumar durante el manejo, mezcla y aplicación de este producto. Use equipo de protección completo: protector de ojos, mascarilla, camisa de manga larga, pantalón, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse con regularidad. Evite el contacto directo del producto con las prendas de vestir, piel, ojos y boca. Evite respirar la llovizna de aspersión. Báñese con suficiente agua y jabón después de cada aplicación y vista ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. Lave la ropa, el protector de ojos, la mascarilla, los guantes y botas con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. La ropa se debe lavar aparte de la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacene bajo llave en un lugar fresco y seco alejado del calor o del fuego. Conserve y almacene el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. Almacene y transporte el producto aparte de herbicidas.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION
DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR
Y PONGASE ROPA LIMPIA.**

**SINTOMAS DE INTOXICACION:**

Puede producir irritación, náuseas y/o vómito. Puede causar alergias en la piel por contacto con el producto.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: De a beber jarabe de ipecacuana a una dosis de 30 ml para adultos y 15 ml para niños.

INHALACION: Retire la persona afectada del área contaminada a una área ventilada y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las prendas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto. Sígase tratamiento médico sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

INSTITUCION	PAIS	No. TELEFONO
CENTRO NAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES	COSTARICA	223-1028
CENTRO DE INFORMACION Y ASISTENCIA TOXICOLOGICA	GUATEMALA	251-3560 232-0735
MINISTERIO DE SALUD SECRETARIA DE RECURSOS	ELSALVADOR	221-0466 EXT. 140
NATURALES SANIDAD VEGETAL	HONDURAS	311-006
CENTRO DE INVESTIGACIONES E INFORMACION DE MEDICAMENTOS Y TOXICOS	PANAMA	269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS**

NO CONTAMINAR FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA O SUPERFICIALES.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos se deben enterrar a no menos de 40 centímetros de profundidad. Estos se deben enterrar en sitios alejados de fuentes de agua superficiales, subterráneas y alejado de las viviendas. En caso de derrames cubra con aserrín o tierra, luego recoja el material y entiérrelo lejos de fuentes de agua.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTIA: La compañía garantiza las características físicas y químicas de este producto que se describe en este empaque, así como los resultados a las dosis recomendadas. No se responsabiliza por el uso indebido ni por los resultados del producto cuando se aplica a dosis diferentes a las indicadas en esta etiqueta. El comprador asume todo riesgo resultante del manejo y uso indebido de este producto.

FABRICADO POR: Pfizer S. A. de C. V. Km. 63 carr. México-Toluca, México

* Marca Registrada de Pfizer Inc. New York, N.Y.

IMPORTADO POR: PFIZER S.A. Y PFIZER ZONA FRANCA S. A., PARQUE INDUSTRIAL ULTRAPARK,
LA AURORA-HEREDIA COSTA RICA TEL.: (506) 293-2345 FAX: (506) 293-2346 APARTADO 10202-1000
SAN JOSÉ, COSTA RICA.

PAIS	Nº DE REG.	FECHA DE REGISTRO
Guatemala	80-04	
El Salvador	4700	
Honduras	298-149-II	
Nicaragua	PF-135-B-2004	
Costa Rica	Reg. MAG 4700	06/08/2001
Panamá	1573	
MEXICO	RSC0 FUNG-0330-001-003-007	