

BIOESTIMULANTE

ABSORCIÓN
RADICAL**AMINOCHEM®**
MATERIA ORGÁNICA **M.O.**

Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:

Tipo:

Concentración:

Ácidos Fúlvicos, Carbono Orgánico, Aminoácidos libres y Nitrógeno

Bioestimulante autorizado por el SAG para su uso en Agricultura orgánica.

Ácidos fúlvicos de origen vegetal: 39 %p/v
Aminoácidos libres de origen vegetal: 13 %p/v
Carbono orgánico de origen vegetal: 22,5 % p/v
Materia seca: 66 % p/v
Nitrógeno total (N Orgánico): 3 % p/v

Formulación:

Densidad a 20°C:

pH a 20°C:

pH a 10% a 20°C:

Solubilidad en agua

a 20° C:

Conductividad

eléctrica a 20°C:

Líquido

1250 g/mL

6

6,5

100 %

18,76 dS/m (directa)

Modo de Acción:

Absorción radical

Características:

AMINOCHEM® M.O. es un producto formulado a partir de compuestos orgánicos de origen vegetal con alto contenido de carbono orgánico, destinado a contribuir a la mejora de las condiciones físicas y químicas del suelo. Su incorporación puede favorecer la estructura del suelo, la retención de humedad y la actividad biológica asociada a la descomposición y transformación de la materia orgánica.

Los componentes presentes en AMINOCHEM® M.O. participan en procesos naturales del suelo que permiten mantener una adecuada dinámica edáfica en sistemas productivos de alta demanda. El producto puede utilizarse como complemento en programas de manejo de suelo orientados a la conservación de su estructura y fertilidad.

BIOESTIMULANTE**Compatibilidad:**

No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

Fitotoxicidad:

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

Aplicaciones:

Cultivo	Dosis L / ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Manzano, Peral	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10 -15 L/ha hasta completar entre 40 - 80 L /ha durante la temporada. Iniciar las aplicaciones desde inicio de floración hasta pinta.
Durazno, Damasco, Cerezo, Nogal, Almendro, Avellano, Granado	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10 -15 L/ha hasta completar entre 40 - 80 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones desde crecimiento vegetativo hasta pinta
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10 - 15 L/ha hasta completar entre 40 - 80 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones desde crecimiento vegetativo hasta pinta.
Vid de mesa	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10 -15 L/ha hasta completar entre 40 - 80 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones desde crecimiento vegetativo hasta pinta.
Vid vinífera y pisquera	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10-15 L/ha hasta completar entre 40 - 80 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones desde crecimiento vegetativo hasta pinta.
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora, Grosella, Berries	5 - 10	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 5-10 L/ha hasta completar entre 30-40 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones desde crecimiento vegetativo hasta pinta.
Palto	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10 - 15 L/ha hasta completar entre 40-80 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones en crecimiento vegetativo.
Kiwi	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10-15 L/ha hasta completar entre 40-80 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones en crecimiento vegetativo.

BIOESTIMULANTE

Aplicaciones:

Cultivo	Dosis fertirriego L/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Olivo	10 - 15	Aplicar desde comienzo del cultivo, semanalmente entre 10-15 L/ha hasta completar entre 40 - 80 L por hectárea durante la temporada. Iniciar las aplicaciones desde crecimiento vegetativo hasta pinta

Precauciones:

Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.