

Bioestimulante natural con Brassinoesteroide.

Descripción

BRASSTEC es un bioestimulante natural a base de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) y brassinosteroides (brassinolide). BRASSTEC contiene más de 60 macro y micronutrientes, carbohidratos, aminoácidos y biopromotores del crecimiento, todos de origen vegetal.

Principales beneficios

- ▶ Estimula el crecimiento vegetativo.
- ▶ Aumenta los rendimientos y la producción de biomasa en diferentes cultivos.
- ▶ Mejora la fotosíntesis y otorga mayor resistencia a estrés abiótico.
- ▶ Regenera las membranas celulares.
- ▶ Transloca los asimilados en la planta y mfrutos.
- ▶ Elongación del tubo polínico, sobre todo ante condiciones de estrés.
- ▶ Favorece y homogeniza la coloración en frutos.
- ▶ Concentra la cosecha.

Especificaciones técnicas

Materia Orgánica	4,54	% p/v
Solubilidad (g/L) a 20°C	973	% p/v
pH	7.57	
Densidad (g/L) a 20°C	1051	

Dosis y métodos de uso

Dosis			
Cultivo	ml/200 L	L/ha	Momentos de aplicación
Vid de mesa	400 - 600	1,2 - 1,5	Inicio de crecimiento de bayas, cada 7 días (2-3 aplicaciones)
		1,2 - 1,5	Entre inicio y 50% color de bayas. Repetir a los 7 días
Cerezo	400 - 600	1,0 - 1,5	Desde inicio de floración cada 7 a 10 días, hasta crecimiento inicial de frutos (2 a 3 aplicaciones)
		2,5 - 3,0	Al inicio de viraje de color. Repetir a los 7 días.
Manzano, peral	400 - 500	1,5 - 2,0	Desde brotación a cosecha, especialmente en periodos de floración, cuaja e inicios de maduración.
Mango		1,0 - 1,5	Desde inicio de floración cada 7 a 10 días, hasta crecimiento inicial de frutos (2 a 3 aplicaciones)
Ciruelo, nectarín, durazno		1,5 - 2,0	Desde brotación a cosecha, especialmente en periodos de floración, cuaje e inicios de maduración
Granada		1,0 - 1,5	Desde inicio de floración cada 7 a 10 días, hasta crecimiento inicial de frutos (2 a 3 aplicaciones)
Arándanos		0,9 - 1,2	Desde la 2da floración, repetir luego de 10 días
Cítricos		2,5 - 3,0	Mandarinos y clementinos desde frutos de 6-8 mm y 10 días después.
Palto		2,0 - 3,0	De 1 a 2 aplicaciones, en frutos a partir de 30-40 mm de diámetro ecuatorial
Hortalizas en general		0,75 - 1,0	El número de aplicaciones depende del efecto buscado; realizarlas a intervalos de 10 a 15 días. Al aplicar preocuparse de mojar bien la planta.
Vía fertirriego		L/ha	Momentos de aplicación
Palto		2,0	Plena floración (30 a 50% de flor abierta)