

ABECTINA® 1.8% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICION:

Abamectina 18 g/L
Aditivoscsp 1 L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 202 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y
Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Limited

Room 1510, No. 500, Xinjiang Road,
Shanghai, China

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

5 Litros

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos
- Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas y gorra.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.
- Conserve **ABECTINA 1.8% EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No almacenar este productos en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos expuestos con agua corriente fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco y mantenerlo en reposo.
- En caso de ingestión: Inducir al vómito los primeros 30 minutos. Proceda al traslado al hospital más cercano.
- Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve, convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
- Contraindicaciones: Barbitúricos o benzodiazepinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un insecticida acaricida de contacto y translaminar, que actúa inhibiendo la señal de transmisión de las uniones neuromusculares, los ácaros e insectos quedan irreversiblemente paralizados y de esta manera mueren.

Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de **ABECTINA 1.8% EC** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla hasta las 3/4 partes de agua o la mitad, agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña al año. Aplicar cuando aparezcan los primeros estados móviles, considerando el umbral económico en cualquier estado de desarrollo del cultivo. Se puede repetir la aplicación con intervalos de 10 a 14 días, dependiendo de la intensidad del ataque.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación, verificando que la aspersión se haya secado sobre la superficie tratada.

COMPATIBILIDAD:

ABECTINA 1.8% EC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente utilizados (no mezclar con Captan). Sin embargo, antes de aplicar en mezcla efectúe una prueba en pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:

No se presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda si se siguen las instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/200L de agua	L/ha		
Tomate	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.25	0.5	3	0.05
	Mosca minadora	<i>Liriomyza braziliensis</i>	-	0.6	3	0.05
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	-	0.6	3	0.01
	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	-	0.4-0.6	3	0.01
	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.4-0.6	3	0.01
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	-	0.6	7	0.02
Limón	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.12-0.15	-	7	0.05
Pimiento	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1-0.15	-	7	0.05
Paprika/jalapeño	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.125-0.15	-	7	0.05
Alcachofa	Mosca minadora	<i>Nemorimyza maculosa</i>	0.15-0.2	-	7	0.01
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.15-0.2	-	14	0.02
Vid	Acaro	<i>Colomerus vitis</i>	-	0.8-1.0	28	0.01
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	--	0.4-0.5	7	0.02
Holantao	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.25	-	3	0.01

PC: Periodo de Carenacia

**L.M.R.: Límite máximo de residuos
(Unión Europea)

