

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Afalon®

50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE(WP)

COMPOSICIÓN:

Linuron 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Reg. N° 148-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd
P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,
Ashdod 7710201. Israel.

CONTENIDO NETO: 1 Kilogramo

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



ADAMA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No desatorar las boquillas con la boca.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fenilureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fue con la piel retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria. Acuda a un médico.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ESSALUD en línea (01) 411-8000 opción 4; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Afalon 50 PM es un herbicida selectivo, recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo.

Sistema de preparación y aplicación:

Afalon 50 PM puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **Afalon 50 PM** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa, sin grumos. Adicionar mas agua revolviendo continuamente y agregar este preparado al tanque de aplicación, el cual contiene el resto del agua, a través de una malla o cedazo. Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado y que el terreno este limpio de rastros, bien mullido, firme y sin terrones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Ver las observaciones del cuadro de usos para definir el momento y forma de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Afalon 50PM es compatible con herbicidas a base de alaclor, atrazina, trifluralina, paraquat y glufosinato de amonio. Sin embargo se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD

Afalon 50PM no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendados. No aplicar en presencia de viento fuerte.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (kg/ha)		LMR (ppm)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico	Suelo liviano	Suelo pesado		
AJO	Verdolaga	Portulaca oleracea	1.0	1.5	0.1	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. En post-emergencia: Aplicar después que el cultivo tenga la segunda hoja desarrollada y una altura de 5 cm.
	Pata de gallina	Eleusine indica				
ANÍS	Amor seco	Bidens pilosa	1.0	2.0	0.1	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. En post-emergencia: Aplicar de forma dirigida sin tocar el cultivo y cuando la maleza no tenga mas de 4 hojas.
APIO	Capulí	Nicandra physalodes	0.5	1.0	0.2	Aplicar entre 10 y 15 días después del trasplante, cuando las malezas aun están tiernas, con no más de 3 hojas.
CAÑA DE AZÚCAR	Cadillo	Cenchrus echinatus	5.0	6.0	0.2	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. En post-emergencia: Aplicar con malezas de nomas de 10 cm de altura.
CEBOLLA	Yuyo	Amaranthus dubius	0.4	0.5	0.2	Aplicar después de transcurridos 8 -12 días del trasplante, apenas nacidos las malezas y repetir cuando sea necesario.
ESPÁRRAGO	Quinua	Chenopodium album	0.6	1.2	7.0	Aplicar en post-emergencia cuando las plantas de espárrago tengan entre 15 a 30 cm y las malezas de 1 a 2 hojas.
MARIGOLD	Hierba gallinazo	Chenopodium murale	0.6	1.2	0.2	Aplicar en post-emergencia temprana una vez que hayan prendido las plántulas de marigold entre 8 a 12 días después del trasplante.
PAPA	Nabo silvestre	Brassica rapa spp. oleifera	1.5	2.5	0.1	En pre-emergencia: Se puede aplicar desde la siembra hasta 12 días después. En post-emergencia: Aplicar de forma dirigida sin tocar la planta de papa y cuando las malezas no tengan mas de 4 hojas.
PIÑA	Rabo de zorra	Setaria verticillata	3.0	5.0	0.1	Aplicar de forma dirigida sin mojar las hojas del cultivo.
PORO	Hierba gallinazo	Chenopodium murale	1.0	1.5	0.1	Aplicar entre 10-15 días del trasplante.
ZANAHORIA	Hierba mara	Galinsoga parviflora	1.5	2.0	0.2	Aplicar después del desarrollo de la tercera hoja verdadera.

LMR : Límite Máximo de Residuos

*No se ha establecido periodo de carencia



Cara

Contracara

Dimensiones 210 mm x 150 mm