

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Fenil Pirazol

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfonos de emergencia

CICOTOX 0-800-1-3040

POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades

ARMEO

200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Fipronil 200 g/l

Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 364-SENASA

Titular de Registro:



POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto MZA 6 Lote 15
Urbanización Santa Patricia II Etapa
La Molina. Lima - Perú
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

Fabricado y formulado por:



POINT AGRO-CHINA LIMITED
Room 1505-1506 Diamond Business Centre
Nanxing Street, Shangcheng District
Hangzhou 310008, China
Tel: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-28007617

Importado y distribuido por:



AGROKLINGE S.A
Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa Ate. Lima-Perú
Telefax: 3483887
R.U.C. N° 20508704217

Cont. Neto: 1Lt

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **ARMEO 200 SC** es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- **ARMEO 200 SC** se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- **ARMEO 200 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL/cilindro 200 Litros	Periodo de Carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.005
Arroz	Gusano rojo	<i>Chironomus xanthus</i>	150	51	0.01
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	21	0.005
Brócoli	Polilla de la brócoli	<i>Plutella xylostella</i>	125	7	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC.: periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

ARMEO 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

