



Mg-Quelat®

Quelato de Aminoácido de Magnesio

Composición Mínima (p/v)

Magnesio (MgO)	8 % p/v
Nitrógeno (N)	4 % p/v
Extractos de Algas Marinas	50% v/v

Nutrifert Mg-Quelat, es un biestimulante líquido en base a Magnesio, Nitrógeno, extracto de algas marinas, polioles naturales, aminoácidos, lo que lo hace ser un producto completo y de alta eficiencia.

Nutrifert Mg-Quelat actúa estimulando el metabolismo de la planta a través de una mayor actividad fotosintética de la planta, además equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de las células, de manera integral, desarrollando su potencial productivo.

Beneficios del Producto

- Estimula la fotosíntesis
- Almacenamiento y transferencia de energía
- Evita clorosis (hojas amarillentas)
- Evita el desorden fisiológico del racimo como “palo negro”
- Mejora la absorción y transporte de fósforo
- Mejora la uniformidad en la madurez de frutos
- Uso de quelato de aminoácido
- Amplio espectro de acción

Uso y Recomendaciones de *Nutrifert Mg-Quelat*

Cultivo	Dosis Litros / ha cc/100 litro agua	Número de Aplicaciones	Momento de Aplicación
Naranjos, limoneros, pomelos, mandarinos, olivos, paltos	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	Botón floral verde y durante etapa de crecimiento de fruto
Vid de mesa, vid vinífera, vid pisquera	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	1° Floración 2° Fruto cuajado 3° Prepinta
Duraznos, almendros, damasco, avellano, cerezos, ciruelos, nogales	3 l/ ha 300 - 400 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	1° Floración 2° Fruto cuajado 3° Prepinta
Arándanos, frutillas, mora, frambuezas, mora, kiwis	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	8 a 12 días antes de floración, Cuaja y post cuaja
Pomáceas (Manzano, peral, membrillo)	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	Puntas verdes y post cuaja. Repetir si es necesario 20 días antes de cosecha
Frejol, arveja, haba, maravilla, lupino, maíz	1-2 l/ ha 400-500 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	10 a 15 días antes de floración 10 a 15 días antes de floración
Melones, sandías, pepinos, zapallos, zapallo guarda	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	20 días antes de cosecha En zapallo de guarda después de cuaja 1 a 2 veces
Tomates, ají, pimientos	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	Con botón floral hasta pinta
Soya, canola	1-2 l/ ha 400-500 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	Antes y después de floración
Arroz, trigo	1-2 l/ ha 400-500 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	En inicio espiga
Brócoli, coliflor, ajo, cebolla, Puerro, cebollín, repollo	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	1ª a los 30 días del transplante, repetir cada 15 días
Papa, camote, alcachofa, espárrago	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	Antes y después de la floración
Ornamentales flores de corte	1-2 l/ ha 350 cc/100 l agua	2-3 cada 10 días	Después de cada corte

Mg-Quelat y Nutrifert son marcas registradas de Nutrifert Co. Todos los derechos reservados.