

Características

FULLCOLOR es un producto de origen vegetal indicado para potenciar la uniformidad de color de los frutos a los que se aplique. Basa su efecto en la acción del Potasio y de la metionina y la fenilalanina (ambas de origen natural) que son precursores de los procesos de maduración.

Contenido Garantizado (p/p):

Nitrógeno (N) total.....2,06%
Óxido de Potasio soluble en agua.....7,39%
Betaina.....9,70%

Otros componentes (p/p):

Fenilalanina.....0,67%
Metionina.....0,64%

Características Físicas:

pH.....7,59
Densidad a 20°C.....1,299 g/cc
Fracción soluble en extracto 5/1000.....100,00%

Contenido en metales pesados:

Arsénico Total.....<2,00 mg/Kg
Cadmio Total.....<0,50 mg/Kg
Mercurio Total.....<0,20 mg/Kg
Plomo Total.....<2,00 mg/Kg

Lea la etiqueta antes de usar el producto



Distribuido por: B98530082

3/Casetes de Isidoro, 32-2 Catarroja (España)
teléfono contacto: +34656900606

CONTENIDO

20 L



FULLCOLOR
PREMIUM

HIDROLIZADO PROTEICO
ORIGEN VEGETAL



Nº lote: FLC001
Fecha fabricación: 04/07/2023
Caduca a los 3 años

Dosis

FULLCOLOR potencia los procesos de maduración de la planta, por lo que debemos de aplicar el producto cuando estemos cercanos a momentos de recolección.

Dosis por aplicación general

Foliar.....5 - 8 L / Ha
Usar un mínimo de 800 L / Ha de volumen de agua en la aplicación

Aplicaciones específicas:

Cítricos, Palta

Realización de dos aplicaciones (1ª 30 días previo a la cosecha - 2ª 15 días antes de cosecha)

Dosis8 L / Ha

Uso de 2000 L / Ha de volumen de agua en la aplicación

Uva mesa

50% Bayas en fase de envero.....5 L / Ha

Realizar dos aplicaciones más con un intervalo de 7 días entre tratamiento.

Uso de 1000 L / Ha de volumen de agua en la aplicación

Tomate, berenjena, Pimiento, otras

En cada fase de corte, con frutos en fase de viraje de color realizar una secuencia de 2 - 3 aplicaciones con intervalo de 7 días

Dosis.....5 L / Ha

Uso de 700 - 1000 L / Ha de volumen de agua en la aplicación.

Observaciones:

No mezclar con aceites, cobres, azúfres y productos de reacción alcalina.

Las recomendaciones e información que facilitamos sobre fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestros control (preparación de mezclas aplicación, climatología, etc.). El usuario será el responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad e general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Precauciones:

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Características

CALCIO PREMIUM es un producto formulado para poder aportar vía suelo y foliar todas o parte de las UF de Calcio que necesite cada cultivo. Por su formulación, se le confiere una rápida absorción debido a la acción complejante de los lignosulfonatos que lleva incorporado el producto.

Contenido Garantizado (p/p):

Nitrógeno (N) total.....2,18%
Óxido de Potasio soluble en agua.....1,88%
Óxido de Calcio soluble en agua.....7,76%

Características Físicas:

pH.....3,40
Densidad.....1,277 g/cc
Conductividad eléctrica a 25°C.....95,5 mS/cm

Contenido en metales pesados (s.m.o):

Cadmio Total.....< 0,50 mg/Kg
Arsénico Total.....< 2,00 mg/kg
Mercurio Total.....< 0,20 mg/kg
Plomo Total.....< 2,00 mg/kg

Lea la etiqueta antes de usar el producto



Distribuido por: B98530082

C/Casetes de Isidoro, 32-2 Cata. (C)ja (Español)

Teléfono contacto: +34656900606



Dosis

CALCIO PREMIUM favorece una absorción rápida del Calcio tanto vía radicular (por el efecto de los lignosulfonatos que son absorbidos por la raíz, e igual comportamiento posee para uso foliar).

Dosis por aplicación general

Radicular.....10 L / Ha
Foliar.....2 L / 1000 L

Aplicaciones específicas:

Citricos, Palta

Cuaje - Engorde (foliar).....5 L / Ha

Inicio engorde (radicular).....10 L / Ha

Repetir esta aplicación radicular al menos 2 veces con un intervalo de 10 - 15 días.

Uva mesa

3 - 5 mm diámetro de baya (foliar).....3 L / Ha

Realizar a partir de este momento dos aplicaciones más apoyadas con MAGNESIO PREMIUM, y en variedades rojas previo a enero junto con PREMIUM KELP.

Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios del sector a las dosis indicadas. No mezclar con Aceites minerales ni con productos de reacción alcalina.

Observaciones: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El usuario será el responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta

Precauciones: Componentes peligrosos: Nitrato de Calcio. H318: Provoca lesiones oculares graves. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280: Llevar gafas de protección, guantes de protección. P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

CONTENIDO



contenido neto:
5L.

Lote de fabricación: EXP24-01
Fecha de producción: 26/12/2023
Fecha de caducidad: 26/12/2025

ABONO INORGÁNICO COMPUESTO A BASE DE MICRONUTRIENTES

La equilibrada proporción de los microelementos cobre, manganeso y zinc, complejados, convierten **BROTOMAX®** en un nutriente alto en energía de fácil asimilación por las hojas, ramas y raíces de las plantas, con acción estimulante y dotado de una completa **sistema ascendente y descendente**.

LISTA DE INGREDIENTES

Lignosulfonato sódico⁽¹⁾

Urea⁽²⁾

Sulfato de cobre⁽³⁾

CONTENIDO DECLARADO

Cobre (Cu) total como hidróxido soluble en agua: 1,83% p/p
Cobre complejo por lignosulfonato: 1,83% p/p
Manganeso (Mn) total como sulfato soluble en agua: 0,73% p/p
Manganeso complejo por lignosulfonato: 0,73% p/p
Zinc (Zn) total como sulfato soluble en agua: 0,46% p/p
Zinc complejo por lignosulfonato: 0,46% p/p
Agente complejante: Ácido lignosulfónico
Nitrogeno (N) total: 8,58% p/p
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad: 4-9
de la fracción complejada: 3-9

Densidad (20°C): 1,23 gr/cc.
pH: 8,40
Conductividad eléctrica:
51,90 mS/cm
Solubilidad en agua: 100%

Metales Pesados:
Arsénico total: As < 2 mg/kg
Cadmio total: Cd < 0,50 mg/kg
Mercurio total: Hg < 0,20 mg/kg
Plomo total: Pb < 2,00 mg/kg

CULTIVOS Y APLICACIONES RECOMENDADAS

BROTOMAX® puede aplicarse en cítricos (mandarino, naranja, limón, etc.), olivar, uva de mesa y vid de vinificación, frutales de hueso (albaricoquero, melocotonero, nectarino, cerezo, etc.), frutales de pepita (manzano, peral, etc.), frutales subtropicales (aguacate, caqui, kiwi, mango, etc.), frutos secos (almendro, nogal, pistacho, etc.), hortícolas tanto en invernadero como al aire libre (ajo, brocoli, cebolla, calabacín, lechuga, melón, pepino, pimiento, tomate, sandía, etc.), hortalizas, frutos rojos y bayas del bosque, así como en cultivos industriales (algodón, arroz, maíz, remolacha, etc.), forestales, ornamentales y áreas verdes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar vía foliar a la dosis de 300 cc a 500 cc por 100 litros de agua, pulverizando una buena cobertura de toda la planta, incluyendo el tronco en cultivos de frutales de hueso. En frutales de hueso se recomienda la aplicación vía riego. Aplicar vía riego a una dosis habitual entre 3 y 5 L/Ha por ciclo de cultivo, o a 5 L/Ha por ciclo de cultivo en plantones se aplicará a las dosis de 5 ml/plie y de 10 ml/plie en cultivos de frutales de hueso o plantones.

Como norma general, se recomienda realizar entre dos y tres aplicaciones de **BROTOMAX®** por ciclo de cultivo, en los momentos de mayor actividad vegetativa. Póngase en contacto con Agrométodos, o su distribuidor habitual, para obtener recomendaciones más específicas.

INCOMPATIBILIDADES

BROTOMAX® es compatible con la mayoría de preparados fitosanitarios empleados normalmente. No utilizar mezclado con aceites. En frutales de hueso no debe mezclarse con captan ni aminoácidos.

(1) N° CAS: 8061-51-6, Lignosulfonic acid sodium salt (CMC 1 Sustancias y mezclas de materiales vírgenes)
(2) N° CAS: 57-13-6, Urea (CMC 1 Sustancias y mezclas de materiales vírgenes)
(3) N° CAS: 7758-99-8, Copper sulphate pentahydrated (CMC 1 Sustancias y mezclas de materiales vírgenes)



© Copyright AGROMÉTODOS, S.A. 1998.
El texto de esta etiqueta está protegido en el Registro de la Propiedad Intelectual. Prohibida su reproducción.

FABRICADO EN ESPAÑA

Fabricante y Titular
de la inscripción

AM AGROMÉTODOS
C/ Dublin, 1 (Edificio Sevilla)
28232 LAS ROZAS (Madrid)
Tel. 91 352 43 96
agrometodos@agrometodos.com

ADVERTENCIA. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 4° C y 30° C. Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).

Gestión de envases: Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador o al depósito del agua de riego destinada a fertilización.



PRECAUCIONES DE EMPLEO Y MANIPULACIÓN
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Producto Clasificado según el Reglamento CE 1272/2008. Consulte la información de seguridad en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad.

UFI: TD40-Q06A-200U-JCU.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

P201: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P273: Evitar la liberación en el medio ambiente.

P280: Usar guantes, ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P301+P312+P330: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con seguridad. Proseguir con el lavado.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Lavar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos: Recoger el vertido.

P308+P313: Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con las normativas locales/regionales/nacionales.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P312: Recoger el vertido.

P314: Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con las normativas locales/regionales/nacionales.

P315: Recoger el vertido.

P316: Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con las normativas locales/regionales/nacionales.

P317: Recoger el vertido.

P318: Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con las normativas locales/regionales/nacionales.

P319: Recoger el vertido.

P320: Recoger el vertido.

P321: Recoger el vertido.

P322: Recoger el vertido.