

PE84449768A



Sivanto® Prime

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado soluble (SL)

Composición:

Flupyradifurone, 200 g/l

Aditivos, csp 1 L

Reg. PQUA N° 1537-SENASA

Formulado por:
Bayer AG
Alte Heerstrasse
41538 Dormagen
Alemania

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE**

**Contenido
Neto: 5 litros**

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es de cuidado, no ingerir. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

-Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

-Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizar para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Butenolide

-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta. Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

-En caso de ingestión: no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente. En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.

-En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) CISPQUIM: 0800-50847 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración y cuando se constate presencia o vuelo de abejas.

-Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Sivanto Prime es un insecticida de acción translaminar y sistémica constituido por el ingrediente activo Flupyradifurone, perteneciente a la clase química Butenolide.

El ingrediente activo Flupyradifurone actúa ocasionando una excitación de la célula nerviosa, no pudiendo ser inactivado por la acetilcolinesterasa. Esto resulta en un trastorno del sistema nervioso y luego en la muerte del insecto tratado.

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	%	L/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	--	0.75	14	0.8
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	--	0.75	3	0.7
Frijol	Chicharrita	<i>Empoasca kraemer</i>	--	0.6	7	0.01
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.125	1	30	3
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	--	0.75 - 1	3	0.8
Arroz	Sogata	<i>Tigridos arizonicus</i>	--	0.5	30	1

PC= Período de carencia (días) LMR= Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan de 1 a 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año previa evaluación de la presencia de la plaga, rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERÍODO DE REINGRESO:

12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

No mezclar con fungicidas azoles.

FITOTOXICIDAD:

Sivanto Prime posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

