

**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No desatorar las boquillas soplando con la boca

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químicos: Ureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios bridar respiración artificial. Acuda a un médico.
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y désetelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

ADAMA

Afalon®
500 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Linuron: 450 g/l
Aditivos: c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 418-97-AG- SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262.
Ashdod 771021, Israel

Contenido neto: **1 LITRO**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Afalon 500 SC es un herbicida selectivo, recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo.

Afalon 500 SC puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Gasto de agua : 200 - 400 litros/ha.

Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y que el terreno este limpio de rastros, bien mullido, firme, sin terrenos y con humedad suficiente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS*		LMR (ppm)	OBSERVACIONES
		L/200L	L/ha		
ALCACHOFA	Capulí cimarrón <i>Nicanandra physalodes</i>	0.5	-	0.05	Aplicar en pre o post-emergencia temprana de las malezas (menores de 10 cm de altura y hasta con 4 hojas verdaderas) dirigido a la zona de riego.
	Amor seco <i>Bidens pilosa</i>				
	Albahaca silvestre <i>Galinsoga parviflora</i>				
	Chamico				
	<i>Datura stramonium</i>				
	Pata de gallina <i>Eleusine indica</i>				
	Pega - Pega <i>Setaria verticillata</i>				
AJO	Verdolaga <i>Portulaca oleraceae</i>	-	1.0-1.5	0.1	En pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. En post-emergencia: Aplicar después que el cultivo tenga la segunda hoja desarrollada y una altura de 5 cm.
	Pata de gallina <i>Eleusine indica</i>	-	1.0-1.5	0.1	
CEBOLLA	Yuyo <i>Amaranthus dubius</i>	-	0.4-0.5	0.2	Aplicar después de transcurridos 8-12 días del trasplante, apenas nacidas las malezas.
ESPÁRRAGO	Quinua <i>Chenopodium album</i>	-	0.8-1.2	7.0	Aplicar en post-emergencia cuando las plantas de espárrago tenga entre 15 a 30 cm y las malezas de 1 a 2 hojas.
PAPA	Nabo silvestre <i>Brassica rapa</i> spp. oleifera	-	1.5-2.5	0.1	En pre-emergencia: Se puede aplicar desde la siembra hasta 12 días después. En post-emergencia: Aplicar de forma dirigida sin tocar la planta de papa y cuando las malezas no tengan más de 4 hojas.
	Galinsoga <i>Galinsoga parviflora</i>	-	1.5-2.0	0.2	Aplicar después del desarrollo de la tercera hoja verdadera del cultivo.
ZANAHORIA	Hierba mora <i>Solanum nigrum</i>	-	1.5-2.0	0.2	Aplicar después del desarrollo de la tercera hoja verdadera del cultivo.

*Para los cultivos donde se presenten dos dosis, emplear la dosis más baja en suelos ligeros y emplear la dosis más alta en suelos pesados
LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón) No se han establecido periodos de carencia

Afalon 500 SC tiene recomendación de uso aprobada en los cultivos de anís, apio, caña de azúcar, marigold, poro y piña. Ver en la hoja informativa adjunta, el cuadro de usos completo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 288 mm x 140 mm

Nota : La presentación de 1 litro esta acompañada de hoja informativa.